

77° CONVEGNO ASSOCIAZIONE TRIVENETA DI UROLOGIA  
**TIPS AND TRICKS IN ENDOUROLOGIA**  
PADOVA, 06 NOVEMBRE 2015

**QUESTIONARIO**

Il test si supera se le risposte esatte sono 9 sul totale dei 12 quesiti.

Barrare una sola risposta. Eventuali altri segni o scritte porteranno all'annullamento della domanda.

- 1) L' approccio percutaneo è ottimale per i diverticoli caliciali
  - 1) superiori
  - 2) anteriori
  - 3) posteriori
  
- 2) L'incidenza dei diverticoli caliciali è
  - 1) < 0.5%
  - 2) 0.5-1%
  - 3) 1-3%
  - 4) 3-5%
  
- 3) Con l' ureteroscopio flessibile si usano fibre laser di calibro
  - 1) 350-380 micron
  - 2) 200-230 micron
  - 3) < 200 micron
  - 4) > 280 micron
  
- 4) Quale delle seguenti sedi anatomiche è la più frequentemente coinvolta dalle lesioni ureterali iatrogene:
  - a) giunto pielo-ureterale
  - b) uretere lombare
  - c) uretere iliaco
  - d) uretere pelvico
  
- 5) I più frequenti responsabili delle lesioni ureterali iatrogene sono:
  - a) urologici
  - b) chirurghi generali
  - c) ginecologici
  - d) chirurghi vascolari
  
- 6) Il GooseNeck® Snare rappresenta un dispositivo ancillare "a cappio" usualmente impiegato in:
  - a) radiologia interventistica vascolare
  - b) endoscopia digestiva
  - c) chirurgia vascolare
  - d) laparoscopia

- 7) Nelle lesioni parziali la ricanalizzazione ureterale risulta usualmente più agevole inserendo una guida per via:
- a) retrograda
  - b) anterograda**
  - c) mista
  - d) tutte le precedenti
- 8) Condizioni patologiche incrementanti il rischio di lesione ureterale intraoperatoria sono:
- a) pregressa chirurgia/radioterapia pelvica
  - b) endometriosi
  - c) neoplasie
  - d) tutte le precedenti**
- 9) In quali dei seguenti casi è indicato collocare uno stent ureterale
- a) Stenosi ureterale da compressione ab extrinseco
  - b) Stenosi ureterale intrinseca
  - c) Dopo una manovra endourologica prolungata
  - d) In tutti i casi precedenti**
- 10) 2) Quale stent è indicato in caso di trattamento di un calcolo renale per via endourologica retrograda
- a) Catetere ureterale semplice
  - b) Catetere ureterale tipo mono J
  - c) Catetere ureterale tipo doppio J**
  - d) Non vi è indicazione al posizionamento di uno stent
- 11) In quale dei seguenti casi si può evitare di impiegare uno stent
- a) Dopo un trattamento ureterorenoscopico retrogrado di un calcolo impattato dell'uretere prossimale
  - b) Dopo un trattamento ureterorenoscopico retrogrado di un calcolo renale di medie dimensioni
  - c) Dopo un tentativo infruttuoso di ureterosopia per mancata compiacenza dell'uretere
  - d) Dopo una ureterosopia diagnostica risultata negativa**
- 12) Quale è il tempo massimo di permanenza in sede degli stent ureterali tipo doppio J a "lunga permanenza"
- a) Un mese
  - b) Sei mesi
  - c) Dodici mesi**
  - d) Ventiquattro mesi

Compilazione a cura del Provider o Ref Scientifico	
quesiti <b>12</b>	risposte esatte