

**CONGRESSO NAZIONALE SIR 2017**  
**Venezia, 16 – 17 febbraio 2016 – Hotel Monaco & Grand Canal**

**QUESTIONARIO**

*Il test si supera se le risposte esatte sono 15 sul totale dei 21 quesiti.*

*Barrare una sola risposta. Eventuali altri segni o scritte porteranno all'annullamento della domanda.*

**1. Che percentuale d'acqua è presente nel vitreo?**

- a) 30%
- b) 55%
- c) 70%
- d) 98%

**2. Come sono le adesioni vitreo-retiniche?**

- a) tutte uguali
- b) più tenaci al polo posteriore
- c) più tenaci lungo le arcate vascolari
- d) più tenaci sul disco ottico alla base del vitreo

**3. Cosa si intende per vitrectomia ad alta velocità?**

- a) Il vitrectomo taglia a 20 tagli al minuto
- b) il vitrectomo taglia a 5000 tagli al minuto
- c) il vitrectomo taglia a 100 tagli al minuto
- d) il vitrectomo taglia a 100,000 tagli al minuto

**4. Quali di queste sostanze si definisce tamponante endoculare?**

- a) olio di silicone
- b) aria
- c) BSS
- d) le prime 2

**5. Quali tra queste elencate rappresentano complicanze dell'iniezione intravitreale?**

- a) Edema maculare
- b) Endoftalmite
- c) Strabismo
- d) Nessuna delle precedenti

**6. Qual è l'incidenza dell'endoftalmite post-intravitreale riportata in letteratura?**

- a) 0.019% to 1.4%
- b) 4%
- c) Nessuna delle precedenti
- d) 5%

**7. Le tavole ETRS sono:**

- a) Tabelle per la misurazione dell'acuità visiva
- b) Strumenti per il calcolo del potere delle IOL
- c) Piani di appoggio per la lampada a fessura
- d) Tavole di conversione del potere diottrico corneale

**8. La sigla QoL significa:**

- a) Quality of Life
- b) Question on Line
- c) Query of Lesson
- d) Queen's online Login

**9. Aflibercept è indicato per il trattamento (negli adulti) di:**

- a) degenerazione maculare neovascolare correlata all'età
- b) edema maculare secondario a occlusione venosa retinica
- c) edema maculare diabetico
- d) Tutte le precedenti

**10. Cosa si intende per small gauge vitrectomy?**

- a) L'utilizzo di vitrectomi 25- o 27-gauge
- b) L'utilizzo di vitrectomi 20-gauge
- c) L'utilizzo di vitrectomi 23-gauge
- d) Tutte le precedenti

**11. Il foro maculare stadio IV è**

- a) un foro retinico a tutto spessore associato a distacco posteriore di vitreo completo
- b) un foro retinico a tutto spessore non associato a distacco posteriore di vitreo completo
- c) è presente il tetto del foro
- d) non si associa ad edema dei margini

**12. Lo pseudoforo maculare**

- a) è un foro maculare non a tutto spessore
- b) rappresenta una soluzione di continuo nel contesto di una membrana epiretinica
- c) il visus è sempre inferiore ad 1/50
- d) non è mai associato a distorsione delle immagini

**13. L' Oftalmoscopia ad Ottica Adattiva permette lo studio dei:**

- a) fotorecettori
- b) capillari perifoveali
- c) fibre nervose retiniche
- d) tutte le precedenti

**14. La toxoplasmosi corioideale è causata da:**

- a) un batterio
- b) un virus
- c) un parassita
- d) un retrovirus

**15. La corioretinopatia sierosa centrale colpisce tipicamente**

- a) Gli anziani
- b) Le donne in post menopausa
- c) I giovani maschi**
- d) Gli adolescenti

**16. La Familial Exudative Vitreoretinopathy**

- a) È una vitreoretinopatia familiare essudativa ereditaria e bilaterale**
- b) È una forma di retinopatia della prematurità
- c) È monolaterale
- d) È una forma particolare di malattia di Coats'.

**17. La retinopatia dei prematuri è classificata in**

- a) 3 stadi
- b) 5 stadi**
- c) 2 stadi
- d) non classificata

**18. La retinopatia diabetica è una malattia**

- a) solamente neurodegenerativa
- b) solamente vascolare
- c) sia neurodegenerativa che vascolare**
- d) nessuna delle precedenti

**19. La retinopatia diabetica può colpire:**

- a) solamente soggetti con diabete mellito di tipo 1
- b) solamente soggetti con diabete mellito di tipo 2
- c) soggetti con diabete mellito sia di tipo 1 che di tipo 2**
- d) solamente soggetti con valori di HbA1c maggiori o uguali a 48 mmol/mol (6.5%)

**20. Possibili complicanze della retinopatia diabetica sono:**

- a) edema maculare
- b) neovascolarizzazione retinica
- c) glaucoma neovascolare
- d) tutte le precedenti**

**21. Quale di queste condizioni determina la necessità di un trattamento laser panfotocoagulativo nella retinopatia diabetica?**

- a) edema maculare
- b) emorragie retiniche
- c) ischemia retinica con presenza di neovasi retinici**
- d) essudati duri

Data \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

Compilazione a cura del Provider

risposte esatte

quesiti  
21